

Tymotka łąkowa KARTA

Najlepsza zarejestrowana odmiana tymotki łąkowej pod względem cech rolniczo – użytkowych

Opis botaniczny: odmiana średnio wczesna, o dużym udziale pędów generatywnych.

Typ użytkowania – odmiana pastewna, przeznaczona do mieszanek na łąki i pastwiska oraz z koniczyną czerwoną na wieloletnie użytkowanie pastwiskowe i łąkowe.

Właściwości rolniczo-użytkowe średniowczesnych odmian tymotki łąkowej wg badań COBORU

Lp	Odmiana	Pocho dzenie	Wartość punktowa w skali 1-5 ⁰						
			plenność	rozkład plonu w sezonie	stabilność w latach	zimo trwałość	dynamika odrast.	zwartość runi	Średnia ocen
1	Karta	PL	5	5	4	5	5	4	4,7
2	Skala	PL	5	4	4	5	5	4	4,5
3	Barfleo	NL	5	4	5	4	4	4	4,3
4	Promesse	NL	5	4	5	4	4	4	4,3
5	Sobol	CZ	5	4	5	4	3	4	4,2
6	Skald	PL	4	4	5	4	4	4	4,2

Produkcja nasienna

1. Duży potencjał plonu nasion 5-10dt/ha,
2. Termin dojrzewania – w końcu lipca lub na początku sierpnia.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 3-5kg/ha nasion.
4. Zalecana szerokość międzyrzędzi 40cm.
5. Zakładanie plantacji nasiennych: jesienią jako wsiewka w zboża ozime (siew trawy w terminie siewu zboża) oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.
6. Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha.
7. Niszczanie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250SL 0,6l/ha.
8. Niszczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica, kurze proso) jesienią w końcu września lub na początku października lub wczesną wiosną– Stomp 330 EC w dawce 5l/ha.
9. Szersze działanie na chwasty jednoliścienne posiada środek Dual Gold 960EC do zastosowania wiosną w dawce 2l/ha. Niszczony również samosiewy zbóż.
10. Nawożenie azotowe w każdym roku użytkowania plantacji: jesienią w drugiej połowie października w ilości 30kg N/ha, oraz wiosną w końcu kwietnia lub na początku maja 50-60kg N/ha
11. Przy dużym nasileniu plantacji tymotki istnieje zagrożenie wystąpienia szkodnika kłósnicy tymotnicy, która uszkadza młode zawiązki kłóskó i kwiatków. Należy opryskać plantacje preparatem owadobójczym np. Owadofos 540Ec w dawce 1l/ha, w terminie kwitnienia drzew wiśniowych
12. Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy 2-3 dni od początku osypywania się nasion. Omłot po 2 tygodniach
13. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata.