

Życica trwała Bajka

Hodowla Roślin Bartązek Sp. z o.o. Grupa IHAR tel. 0 605 829 744

Opis botaniczny: odmiana diploidalna 2n, średniowczesna, rośliny o średniej wysokości i zielonej barwie liści, z dużym udziałem pędów generatywnych.

Cechy użytkowe

- Typ użytkowania – odmiana pastewna, przeznaczona do mieszanek kośnych i pastwiskowych. Może być stosowana do zagospodarowania zdegradowanych użytków zielonych. Może być stosowana do podsiewu punktowego darni, pastwiska po kretowiskach i wypadach roślin.
- Cechy użytkowe: odmiana Bajka charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy o dobrej jakości – strawności i smakowitości. Dobrze znosi wielokrotne koszenie, przygryzanie i udeptywanie. Szybko odrasta po koszeniu. Charakteryzuje się dobrym przetrzymywaniem i trwałością roślin. Mało podatna na choroby liści i pędów.

Produkcja nasienna

1. Duży potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Termin dojrzewania – przed żniwami rzepakowymi, 2-3 tygodnie wcześniej od odmiany Stadion.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 8-10kg/ha (maksymalnie 10kg/ha).
4. Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym w okresie późnoletnim (w terminie od 25 sierpnia do 10 września) oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.
5. Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach środkami Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha.
6. Niszczanie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką
7. Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250 SL 0,6l/ha.
8. Niszczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych(miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica - kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną środkiem Stomp 330 EC w dawce 5l/ha.
9. Zapobieganie białokłosości- niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Owadofos 540 EC(1l/ha) lub Decis 2,5EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.
10. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło (pierwszego kolanka) – oprysk środkiem Moddus 250 EC w dawce 0,75-0,8l/ha
11. Możliwość stosowania środków przyśpieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu – Reglone 200 SL 2-3l/ha + zwilżacz lub Roundup do 2,5l/ha (przy likwidacji plantacji)
12. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion.
13. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata.