

Wiechlina łąkowa Sójka

Opis botaniczny: odmiana średnio wczesna, rośliny o ciemnozielonej barwie liścia i średniej szerokości blaszki liściowej, o wysokości 60-90cm,

Cechy użytkowe

1. Typ użytkowania – odmiana trawnikowa przeznaczona do obsiewów terenów zielonych, boisk sportowych, trawników przydomowych. Odpowiednia do mieszanek gazonowych z innymi gatunkami form trawnikowych.

2. Cechy użytkowe: odmiana trwała, charakteryzuje się wolnym odrastaniem po skoszeniu, posiada trudny do rozerwania system korzeniowy tworzy gęstą darni, dobrze znosi częste i niskie koszenie. Odmiana charakteryzuje się wysoką masą tysiąca nasion

Produkcja nasienna

1. Potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Termin dojrzewania – od połowy do końca czerwca, zależnie od roku.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 5-7kg/ha nasion.
4. Zakładanie plantacji nasiennych:
5. - siew późno wiosenny w końcu czerwca lub na początku lipca,
6. - siew wiosenny od marca do końca kwietnia z rośliną towarzyszącą: mak, groch,
 - a. gorczyca biała.
7. Niszczanie chwastów dwuliściennych środkiem Aminopielik D 450 SL w dawce 3l/ha lub Chwastox D 179 SL w dawce 5l/ha
8. Niszczanie chwastów jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina roczna, kurze proso) preparatem Dual Gold 960EC w dawce 2l/ha. W roku siewu w połowie września, w latach następnych w okresie wschodu chwastów i samosiewów trawy tj. w końcu sierpnia lub na początku września. Stosowany na wiosnę zwalcza kurze proso.
9. Zapobieganie białokłosości – niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Owadofos 540 EC (1l/ha) lub Decis 2,5 EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.
10. Zapobieganie porażeniu sporyszem – oprysk preparatem Punch Bis 400EC w dawce 1/ha, w terminie początku kwitnienia trawy.
11. Nawożenie azotowe w każdym roku użytkowania plantacji: jesienią, w drugiej połowie października 30kg N/ha oraz wiosną jak najwcześniej 60kg N/ha.
12. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło (pierwszego kolanka) – oprysk środkiem Moddus 250 EC w dawce 0,3-0,5l/ha

13. Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy w pełnej dojrzałości nasion.. Młócenie po ok. 2 tygodniach.
14. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion
15. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 3 lata.